



Checkliste

Brauenlifting (Schläfenlifting)

Sehr geehrte Patientin,

Sie haben sich für ein operatives Brauen- bzw. Schläfenlifting entschieden. Oft führt das Absinken der seitlichen Brauenregion zu einem veränderten traurigen Gesichtsausdruck oder zu einer Einschränkung des seitlichen Blickfeldes. Beim Schläfenlifting wird über einen Schnitt am Haaransatz die seitliche Augenbrauenregion angehoben und damit der jugendliche Gesichtsausdruck zurückgewonnen. Ziel ist ein natürliches Ergebnis ohne operiert auszusehen. Oft wird dieser Eingriff mit einer Oberlidstraffung kombiniert.

Das Schläfenlifting kann gut in örtlicher Betäubung vorgenommen werden. Es entsteht eine Narbe knapp am Haaransatz oder versteckt im behaarten Areal der Schläfe. Die Narbe verblasst meist schon nach wenigen Wochen. Eine Kombination mit einem Lipofilling der Schläfen- und Brauenregion ist möglich.

Die Operation wird in örtlicher Betäubung und ambulant im OP der Ordination durchgeführt.

Die Gesamtkosten (inklusive aller Nachkontrollen) betragen EUR 2.800,-

Bei Kombinationseingriffen erhalten Sie die genaue Kostenaufstellung im Rahmen der Erstberatung

Ich bitte Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten.

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Univ.Doz.Dr. Greta Nehrer

VOR DER BEHANDLUNG

- Sie sollten bereits 10 Tage vor Ihrem Termin keine blutverdünnenden Medikamente (z.B. Aspirin) einnehmen.
- Bitte kommen Sie ohne Make-up und ohne Kontaktlinsen zu Ihrem Termin.
- Bitte bringen Sie den unterschriebenen Aufklärungsbogen mit.
- Vor der Operation werden wir noch einmal den Ablauf im Detail besprechen. Es werden Fotos zur Dokumentation angefertigt.
- Falls Sie beunruhigt sind, verabreichen wir gerne eine Beruhigungstablette.
- Wir empfehlen Ihnen, sich nach der Operation von jemandem nach Hause bringen zu lassen.

WÄHREND DER BEHANDLUNG

- Die Operation dauert etwa 45 Minuten.
- Sie verspüren nur ein leichtes Brennen während der Betäubung.
- Die Naht wird nur mit einem Pflasterspray versorgt.
- Sie erhalten einen Stirnverband für eine Nacht.

NACH DER BEHANDLUNG

- Beim Nachlassen der Betäubung ist ein leichter brennender Wundschmerz normal. Sie werden keine starken Schmerzen haben!
- Wir empfehlen Ruhe und Kühlung der Augenregion in den ersten 2 Tagen nach der OP. Vermeiden Sie Anstrengungen!
- Am 1. bis 3. Tag nach der Operation wird der Stirnverband entfernt und die OP-Region kontrolliert. Schwellungen und Blutergüsse der Schläfen- und Lidregion sind völlig normal und können 1-2 Wochen andauern.
- Nach einer Woche ist eine Haarwäsche wieder möglich.
- Üblicherweise sind Sie 1 Woche nach der OP wieder gesellschaftsfähig. Falls blaue Flecken oder Schwellungen auftreten, können diese aber auch länger anhalten. Wichtige gesellschaftliche Termine sollten daher erst nach etwa 3 Wochen geplant werden.
- Vermeiden Sie Hitze (Sauna) und sportliche Aktivität für 2-3 Wochen.
- Der Operationserfolg ist erst nach etwa 3 Monaten beurteilbar.